





nlantanlantanlantanlantanl





Désignation: Zenfandel Planche 12 caté A No 104 Vigueur : 2 Charge : Date de mâturité: (77, 9-56) +4 11-0

Désignation: Zinfondel-Clos Planche 12 Côté A Nº 104 Vigueur: 3 Charge : Date de mâturité:

M: le 28-8-1958 PR:0)

Linfandel

Désignation:

Clos Planche/2 Coté A No. 104

Vigueur: 2

Charge :

marte s. X

Désignation: Zinfandel Clos Planche 12 Côté A No 104 Vigueur : 1 31-8-59 Ro=0 Charge: s. X 21 3 V 4 4 5 4

Année .	1956			fandel none.		• 0	(Côté	.12	A	10	4.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Nombre total	20	23	16.	D A .	31.		• !		! !		. !
1 1 1 1 1 1 3	3 1		0.	1	<i>j</i> .	.2.		. ! . ! . !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		. !
1 5	381	0.	10.	.0.	0.	.i.	•	. ! !		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		.!
	at			31-3-	56	71						

	1	1						
	! Nombre ! total	1113	!	DAT!	ES!	!	! !	!
~	1	!	 !	!	1	1	1	1
X	13.	! ., .	 i	i	i		i	
3			1		!			1
5	1.3.	10.	!	1		1	1	1

i.2. i.1.

Dle 25-3-59

! 9

10

| D& 23-2:61 x

ANNEE: 1995

NOM PRIMITIVO - Zinfandel EMPLACEMENT I 1485 1277-06 2845-71-75.

	2841-71-7
1277-06	20142-11-7

ouche Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		vé: début	raison mi/v	fin	Maturit é
3 2 4 2 5 3 14	12,3 12.3 6,3	20,3° 16,3° 16,3° 18,3° 18,3°	0 0 3 14	Couleur Saveur Pépins Port:	: G - TG - (disc-: r : B-(: s - : avec	M - P Mil Fresh Gr-Rs-l m - a.	Dim 1: - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	24.7 im: obov-cy Jus	7,8 +3 Compact rl-fus : inc	168	M. 9 +4 L - M -C

ANNEE: 1995

NOM Zuifandel n EMPLACENTINI 2 R 7 A 71.75

12	77.0	6										
ouche	Nbre		rrement mi/déb			Ferti- Floraison lité début mi/f fin				raison mi/v	Maturité	
1 2 3 4 5	3 227			5 207	Couleu	29.6 : G - TG - G disc-s : B-C : avec	1.6 +4 M - P Mil i - M sph-el sr-Rs-l m - a	Dim : - P D: 1 - Ov-C Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	Compa-	cité:	L - M -C

Désignation: Zinfandel

VASSAL Planche XII Côté A Nº 104 Souche 1 2 34 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 -autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches ① fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes ⑤ à
 plages bronzées 6 entièrement bronzées - vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première fouille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° en de
 la 3° fouille détachées sera notée.

R. Bernard

Désignation: Zinfandel

VASSAL Planche 12 côté A Nº 104 souche 12 345

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8
- 27 à limbe plan 1 en gouttière (2) involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

C.Samson ,81,5,54

Désignation :

Zurfandel

faille

Planche 12 côté A Nº 104 souche 1 2 3 4 5 VASSAL

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds:
- ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.

 verte 0 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.
- coloré (7) vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 22-6-54

Landier 15-6-55

Désignation

Zinfandel

VASSAL planche 2 côté A Nº W4 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - aranéeux (7) duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté () révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan - en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 5 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3)
- glabre séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 2 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

18.7. 56

Désignation Cinfandel

VASSAL planched 2côté A Nº 104 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniel 57

```
Désignation Zinfau del
              planche Il côté # Nº WW souche 1 2. 3 4 5
    VASSAL
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite
    - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
cation
    - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré
                                      BAIE Eliplo-
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
2 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde U - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée
    - A jus incolore ( - coloré 2.
     - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
     - A saveur neutre 1 - fade - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court(3)
     - A pédicelle de couleur : verte ( - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verto (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident  - peu apparent 2.
     - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile
```

Nº d'ordre

Zinfandel Planche côté Rang souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3) : glabre (2), à épines cu analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jauno (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (4), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux ; marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel 3-11-61.

```
Nº d'ordre: . . 003301 . Désignation: Zinfandel . .
         . . . . . . . vas. 12. A. 10.4 . vign. .
Emplacement:
8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2) - 3.-
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8-
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -2-3
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - 2-3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . . . . ①- 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction : 1-(2)-3.
               Forme : (4) - 5
               Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Formulaire de description 2/8

(floraison)

Année: Loso Code cépage: 1277

Code introduction: 06

Nom introduction : Brimitivo

Observateur T

Emplacement 2 R717-75

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7)

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1)- en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée): verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface (4)

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf.: nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204. Densité poils dressés face sup.: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup.: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup.: blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. mulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés nervures face inf.: nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année: 2000

Code introduction: 06

Observateur: TL

Code cépage : 1277 Nom introduction Brimitio

Emplacement: 2 R724 75

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3) horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9 oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5} forte 7 - très forte 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges(2)- rouge 3. oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 rouge 3. oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2) rouge 3) oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2) rouge 3.

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1) présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence D- présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1) moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1) moyenne 5 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7) très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles : discontinue (2 ou moins) - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5}- longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1) au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4 oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 présence 9

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7) très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - 2010 ?.

000-21 Couleur des vrilles jaune 1 - rouge clair 2 - rouge foncé 3 - vert 4

Bouton floral: petil 1 - moyen 2 - gros 3.

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 2000

Code cépage : 1277

Nom introduction : Pinitios

Code introduction : OC

Observateur: 72

Emplacement: 2 R7571-75

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sep 4- plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 2 - présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenné 5)- forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3) égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [sinus pétiolaire : ouverture = 1-2(3)4-5-6 / forme = (U)accol. - V / dent = oui-non / dégarni = non-parfo s-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7)- très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible(1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1)

Formulaire de description 5/8

(maturité)

Année: 2000

Code cépage : Nom introduction: Code introduction: 06

Observateur: TL

Emplacement: 2R7571.75

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) (5)longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 15

oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 5)

large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 13

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5)- compacte 7)- très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3)- moyen (5-7 cm) 5

long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1- moitié 5 - plus de la moitié 7. per ou le colre

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 - en entonnoir 3.

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2) plus de trois ailes 3

Baie

oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.)

oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-

26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.)

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3.

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2) elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6)

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2)

oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5)- épaisse 7 - très épaisse 9.

oiv 229 ombilic : peu apparent (1) apparent 2

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1)- colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9

oiv 236 saveur : aucune(1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3)- moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9

oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 longs 7 - très longs 9. 7

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 12- présentes 2

Vassal: 000-11 grappe: axe de la rafle: non coloré 2 - coloré(1) -> pedon cale

000-18 région ombilicale : déprimée 1 – non déprimée 2

Millerandage: nul à très faible 1 – faible 3 – moyer 5) – fort 7 – très fort 9

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année : 2000

Code cépage: 1277 Code introduction: 06

Nom introduction : Primitivo

Observateur: TKTD

Emplacement: 2R754-75

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence ①- présence 9.

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte \mathcal{O} - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 3

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue :

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2) - saillants 3.

Pruine sur sarment: absence D- partiellement présente 2 - présente 3.

Formulaire de description 7/8 (herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année: 2000

Code introduction

Observateur

Code cépage Nom introduction : PRIMITIVO

Emplacement

Feuille d'herbier

oiv 076 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2)- mélange notation 2 et 4 : 3 côtés convexes 4 - un côté concave, un côté convexe 5. oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes 5 - grandes 7 - très grandes 9 oiv 078 rapport longueur/largeur dents : très courtes 1 - courtes 3 - moyennes 5 - longues 72 très longues 9

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert 2 - peu ouvert 3 - fermé 4 lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6. oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U(1)- en accolade 2 - en V 3. oiv 081-1 dents sur bord sinus pétiolaire : absence 1)- présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2 oiv 081-2 sinus pétiolaire dégarni : absence 1) présence fréquente sur un côté 2 - présence fréquente sur deux côtés 3. oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus 1 - ouvert 2 - fermé 3 lobes chevauchants (4) oiv 083-1 forme base sinus latéraux supérieurs : en U(1)- en accolade 2 - en V 3 oiv 083-2 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence 1)- présence fréquente 2

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 longueur nervure N1: très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9. Valeur absolue (en mm): 121 oiv 602 longueur nervure N2: très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9. Valeur absolue (en mm): 112 oiv 603 longueur nervure N3: très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9. Valeur absolue (en mm): 89 oiv 604 longueur nervure N4: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm): 56

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1) : très courte (3cm) 1 - courte (5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>11cm) 9. Valeur absolue (en mm): 4 oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (3cm) 1 - courte (4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm): 4

oiv 607 angle entre N1 et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en°): 53 oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °): 41 oiv 609 angle entre N3 et N4: très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9 Valeur absolue (en °): 56 oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit 1 petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue (en °): 77

Formulaire de description 7/8 (suite)

(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<6cm) 1 - étroite (10cm) 3 - moyenne (14cm) 5 large (18cm) 7 - très large (>22cm) 9. Valeur absolue (en mm): oiv 612 longueur de la dent N2: très courte (<6mm) 1 - courte (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm): 14 oiv 613 largeur de la dent N2 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm): 14 oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm): // oiv 615 largeur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. Valeur absolue (en mm): 14 oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue: 6 oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très courte 1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9. Valeur absolue (en mm) : 6 oiv 066.4* longueur nervure N5: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. Valeur absolue (en mm): 32 oiv 066.5* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) 1 - courte (8mm) 3 moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 14 oiv 079.1* ouverture/superposition du sinus pétiolaire : très ouvert (<-35mm) 1 ouvert (-15mm) 3 - fermé (-5mm) 5 - chevauchant (+25mm) 7 - très chevauchant (>+45mm) 9. Valeur absolue (en mm): 3

Vassal:

Angle du lobe terminal : faible (<90°)1- moyen (=90°)2- grand (>90°) 3.

Formulaire de description 8bis/8

(maturité - non vinifié)

Année: 2000

Code introduction :

Code cépage: 1277 Nom introduction : Primitivo

()bservateur : TD

Emplacement 2R7 10 74-75

Récolte

oiv 502 poids d'une grappe : très faible (<100g) 1 - faible (200g) 3 - moyen (400g) 5 -

élevé (800g) 7 - très élevé (>1200g) 9. Valeur absolue (en g)

oiv 503 poids d'une baie : très faible (1g) 1 - faible (2g) 3 - moyen (4g) 5 - élevé (8g) 7 - très élevé

(>12g) 9. Valeur absolue (en g)

oiv 504 rendement en kg/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Valeur absolue

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 505 teneur en sucre du moût : très faible (<13%) 1 - faible (15%) 3 - moyen (18%) 5 - élevé

(21%) 7 - très élevé (>24%) 9. Valeur absolue (en %)

oiv 506 acidité totale du moût : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9

Valeur absolue (en g H2SO4/l)

oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal:

Code: 1277	NOM: Primitivo	EMPLACEMENT 2 R7 & 71-75
Vendange	Date: 18/09/2000 Nombre de souches récoltées: 2 Poids total dè la vendange: 1kg 270 Nombre total de grappes: 3 Rendement à l'hectare: 2745 Kg = (poids total / nbr souches) x 4500 Pourriture (%): 407. Couleur épiderme: N Saveur: Simile	Poids d'une grappe (oiv 502): 15 258 Poids d'une baie (oiv 503): 2,039
Pressurage	Rendement en jus (ml / 100 g baies) (oiv 233): Indice réfractométrique (oiv 505): Ag Acidité moût (g H2SO4/l) (oiv 506): 7 pH du moût:	
Pépins	Poids de 100 pépins secs (g) : longueur des pépins (mm) (oiv 242):	Poids d'un pépin (oiv 243) :

Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

33.01 Zim Année:

Code clone : 6

Observateur

Code cépage :

Nom cépage : Primitivo Emplacement 2R717-75

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9 oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)		
1	4	20.3	₹3.3	6			
2	Abe						
3	2	16-3	16.3		300		
4	k	16.3	23.3	1	1		
5	4	16-3	23.3	4	2,0		
Moyenne	14			11/10=110	8		

+47

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement
21/05	24/05	29/05		23/07	30/07	13/08	24/08	(oiv 306)

+2

Formulaire de description 2/8

(floraison)

Année: 2001

Code cépage : 1277

Code introduction: 06

Nom introduction: Primetivo Observateur TD

Emplacement 2 R7 176.75

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2 - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 32 moyenne 5 forte 7 - très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 7 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 32 cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible/D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible/3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible (1)- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204. Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 🕅 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 209 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté Ø - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225 Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 -

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 9 - faible 3 - moyenne 5 - foite 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible & - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 👀

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année

2001

Code introduction: 06

Observateur

Code cépage : 1277 Nom introduction:

Emplacement 2R714.75

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé V - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9 oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 6)- forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 rouge 3 oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte P - verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2> rouge 3. oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte P - verte à raies rouges 2 - rouge 3

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence - présence 9

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence P- présence 9

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible Ø-moyenne 5 - forte 9

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible ? - moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) O- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 6- longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins(1)-1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4 oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 présence o

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (+1-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 😥

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - 211 1110 6.

000-21 Couleur des vrilles : jaune (1) - rouge clair 2 - rouge foncé 3 vert 4

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

2001 Année:

Code cépage: 1277

Code introduction: 06

Nom introduction: Primitivo

Observateur: TD

Emplacement: 2 R7s71.78

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé ?

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 32 rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente 10- présente 9

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente D- présente 9

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 95 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente (1) - présente 9.

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 17 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. | sinus pétiolaire : ouverture = 1/23-4-5-6 / forme = O-accol. - V / dent = oui-non/ dégarni non-parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3/- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré(1)

Formulaire de description 5/8 (maturité) Année: 2001 Observateur Code cépage: 1277 Code introduction: 06 Nom introduction : Primitivo Emplacement 2R714-75 Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 15 oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) (\$ large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 10 oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 2-très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3) moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1)- moitié 5 - plus de la moitié 7 oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2 en entonnoir 3. oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes 2) plus de trois ailes 3 Baie oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) (5-longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 17 oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 14 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1)- uniforme 3 oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2)- elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8 oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6. oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2. oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 - très forte 9 oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9. oiv 229 ombilic : peu apparent 1) apparent 2 oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 / colorée 2 oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse(2) oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucung 1 - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3)- moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9 oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3) oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1)- présentes 2 Vassal: 000-11 grappe: axe de la rafle: non coloré(2) coloré 1 000-18 région ombilicale : déprimée 1 - non déprimée 2.)

Millerandage nul à très faible 1 - faible 3 + moyen 5 - fort 7 - très fort 9

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2001

Code cépage :

Code introduction:

Nom introduction: Premilio

Observateur: Tp

Emplacement: 2R7sH-75

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes ? - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence P- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 12 présence 9.

oiv 351 vigueur: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 100

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

Valeur absolue: 7

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.